

درس مقاييس التشتت

المحتوى:

- مقاييس التشتت المطلق:

المدى العام -

المدى الربيعي -

نصف المدى الربيعي -

الانحراف المتوسط، الوسيطي، المنوالى -

- مقاييس التشتت النسبي

التباین -

الانحراف المعياري -

معامل الاختلاف -

الخواص -

- تمارين

المدة: أسبوعان (ست ساعات)

تمهيد:

تمثل مقاييس التشتت الجانب الآخر من المقاييس الإحصائية الأساسية بجانب مقاييس النزعة المركزية، حيث تستخدم تلك المقاييس في وصف البيانات والتعرف على خصائصها. كما تعمل مقاييس التشتت كجزء مكملة و مهمة جداً بجانب مقاييس النزعة المركزية في عمليات الاستدلال الإحصائي المبني على عملية التعامل مع البيانات. وينصب الاهتمام عند التعامل مع مقاييس التشتت حول درجة الاختلاف بين القيم المختلفة للمتغير الكمي المدروس، ويتم ذلك من خلال عدة مقاييس مختلفة يهتم كل واحد منها بقياس درجة الاختلاف بين القيم المختلفة للمتغير الكمي المدروس، ويتم ذلك من خلال عدة مقاييس مختلفة يهتم كل واحد منها بقياس درجة الاختلاف من زاوية مختلفة.

١- مقاييس التشتت المطلق

يتم الحصول على مقاييس التشتت بنفس وحدة القياس للظاهرة تحت الدراسة. هناك عدة مقاييس إحصائية لقياس التشتت المطلق، فيما بينها من حيث الدقة والسهولة، ومن أهمها نجد المدى العام، المدى الربيعي، نصف المدى الربيعي، الانحراف المتوسط، التباين والانحراف المعياري.^١.

٢- المدى العام:

¹ مصطفى عبد المنعم الخواجة، مرجع سابق، ص 119.

يعرف بأنه الفرق بين أكبر وأصغر قيمة لمتغير معين، ويعتبر المدى من أبسط مقاييس التشتت. ومع ذلك فإن المدى يأخذ في الاعتبار فقط القيمتين المتطرفتين في المجموعة، ولا يمتدنا بمقاييس التشتت القيم الأخرى فيما عدا أنها تقع بين هاتين القيمتين المتطرفتين.¹

أ- المدى العام في حالة البيانات غير المبوبة: يحسب المدى العام بالمعادلة التالية:

$$\text{المدى العام} = \text{أكبر قيمة} - \text{أصغر قيمة}$$

مثال: أحسب المدى لمجموعة الأعداد التالية:

$$\text{المجموعة الأولى: } 12, 15, 6, 9, 18, 3, 5, 4.$$

$$\text{المجموعة الثانية: } 8, 3, 7, 6, 9, 8, 9, 18.$$

الحل:

$$\text{المدى} = \text{أكبر قيمة} - \text{أصغر قيمة}$$

$$\text{المدى بالنسبة للمجموعة الأولى} = 18 - 3 = 15$$

$$\text{المدى بالنسبة للمجموعة الثانية} = 18 - 3 = 15$$

رغم أن المدى واحد في الحالتين فإن هناك تشتتاً أكبر في المجموعة الأولى عنها في المجموعة الثانية.

¹ معين أمين السيد، مرجع سابق، ص 98.

بـ- المدى العام في حالة البيانات غير ممبوبة: له أكثر من صيغة، ومنها

المعادلة:

$$\text{المدى العام} = (\text{الحد الأعلى للفئة الأخيرة}) - (\text{الحد الأدنى للفئة الأولى})$$

مثال: الجدول التكراري التالي يبين توزيع 50 مزرعة حسب المساحة المزروعة بالقمح بالألف هكتار.

[15-20]	[21-26]	[27-32]	[33-83]	[39-44]	[45-50]	المساحة
3	7	10	15	12	3	عدد المزارع

المطلوب: حساب المدى ل المساحة المزروعة بالقمح؟

الحل:

$$\text{المدى} = (\text{الحد الأعلى للفئة الأخيرة}) - (\text{الحد الأدنى للفئة الأولى})$$

$$R = 50 - 15 = 35 \text{ هكتار}$$

2- المدى الربيعي:

هو الفرق بين الربع الثالث والأول أي: $IQ = Q_3 - Q_1$

ملاحظة: نلاحظ أن المدى الربيعي قد ابتعد عن القيم المتطرفة فهو أحسن من المدى، ولكن بقي يستعمل قيمتين فقط ويهمل باقي البيانات فهو لا يعكس حقيقة التشتت.

خصائص المدى الربيعي:

يتميز المدى الربيعي بالخصائص التالية:¹

-1- يضم 50% من المجتمع مهما كان التوزيع الإحصائي.

-2- يتغير طوله مقارنة بالمدى العام حسب طبيعة التوزيع.

¹ جلاطو جيلالي، مرجع سبق ذكره، ص 71

-3- استعمالاته محدودة نظراً لبساطته، غير أنه أحسن من المدى العام.

-4- يستعمل في المقارنة بين توزيعين إحصائيين أو أكثر.

مثال: السلسلة الإحصائية التالية تبين مداخيل 11 وحدة إحصائية:

.1400, 1300, 1300, 1100, 1200, 1100, 1000, 900, 900, 800, 700

المطلوب: حساب المدى الربيعي؟

الحل:

-تحديد قيمة Q_1 ، ولحساب هذه القيمة نحدد مرتبتها، نلاحظ أن عدد القيم فردي إذن المرتبة

هي:

$$\frac{11 + 1}{4} = 3$$

-ترتيب القيم تصاعديا، فنجد أن: $Q_1 = 900$

وبنفس الطريقة نجد أن: $Q_3 = 1300$

ومنه: $IQ = Q_3 - Q_1$

$$= 1300 - 900 = 400$$

3-نصف المدى الربيعي:

ويطلق عليه الانحراف الربيعي، وهو يستخدم لمعالجة عيب المدى من تصادف وجود قيم شاذة

طرفية للحد الأدنى والأعلى لقيم الظاهرة، ويعطى بالصيغة التالية:

$$\frac{IQ}{2} = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

مثال: بأخذ قيم المثال السابق:

$$\frac{IQ}{2} = \frac{1300 - 900}{2} = 200$$

أما إذا أردنا أن نقلل من أثر القيم المتطرفة فإننا نقوم باستبعادها ويمكن أن يتم ذلك باستخدام الطرق التالية:

- المدى الربيعي = الربيع الثالث - الربيع الأول.
- المدى العشري = العشر التاسع - العشر الأول.
- المدى المئيني = المئين 99 - المئين الأول.

4-1 الانحراف المتوسط:

يعرف الانحراف المتوسط بأنه البعد المتوسط لقييم المتغير الإحصائي عن قيمة مركبة.

أي هو عبارة بأنه المتوسط الحسابي للقيم المطلقة لأنحرافات القيم عن

متوسطها الحسابي، وسوف نرمز للانحراف المتوسط في دراستنا بالرمز MD^1 .

$$MD = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n}$$

وهو يحسب وفقا لحالتين:

أ- حالة البيانات الغير مبوبة:

بعد حساب المتوسط الحسابي يمكن حساب الانحراف المتوسط مباشرة.

مثال: لتكن القيم التالية: 50, 60, 70, 80, 90.

¹ جيلالي جلاطو، مرجع سابق، ص 73.

المطلوب: إيجاد الانحراف المتوسط؟

نحدد أولاً المتوسط الحسابي:

$$\bar{X} = \frac{\sum xi}{n} = \frac{50 + 70 + 60 + 80 + 90}{5}$$

الانحراف المتوسط :

$$MD = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n}$$

$$MD = \frac{|50 - 70| + |70 - 70| + |60 - 70| + |80 - 70| + |90 - 70|}{5}$$

$$= 12$$

بـ-حالة البيانات المبوءة:

في هذه الحالة يحسب الانحراف المتوسط من خلال العلاقة:

$$MD = \frac{\sum |x_i - \bar{x}| n_i}{n_i}$$

حيث: x_i : مركز الفئات

n: التكرارات

مثال: يبين الجدول التكراري التالي توزيع 40 أسرة حسب الإنفاق الشهري بالآلاف دولار.

الإنفاق	[2-5]	[6-9]	[10-13]	[14-17]	[18-21]
عدد الأسرة	1	8	13	10	8

المطلوب: أوجد الانحراف المتوسط؟

الحل:

| نوع التحديد | القيمة المحددة |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| نوع التحديد | القيمة المحددة |
| نوع التحديد | القيمة المحددة |
| نوع التحديد | القيمة المحددة |
| نوع التحديد | القيمة المحددة |

[2-5]	1	3.5	3.5	9.6	9.6
[6-9]	8	7.5	60	5.6	44.8
[10-13]	13	11.5	149.5	1.6	20.8
[14-17]	10	15.5	155	2.4	24
[18-21]	8	19.5	156	6.4	51.2
المجموع	40		524		150.4

حساب الوسط الحسابي:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{524}{40} = 13.1$$

إذا الانحراف المتوسط هو:

$$MD = \frac{\sum |x_i - \bar{x}| n_i}{n_i}$$

$$= \frac{150.4}{40} = 3.76$$

ويعتبر الانحراف المتوسط أفضل من سابقه (المدى) لأنه أقل تأثير بالقيم المتطرفة غير أنه لا يستعمل بشكل واسع بسبب اعتماده على القيم المطلقة لانحرافات القيم عن متوسطها الحسابي. وهو يتميز بالخواص التالية:

- يعتمد في حسابه على جميع القيم وليس على القيمة الكبرى والصغرى فقط.
- لا يمكن حسابه في حالة التوزيعات التكرارية المفتوحة.
- يتأثر بالقيم المتطرفة، لأن انحرافها عن المتوسط الحسابي يكون كبيراً.

5 التباین:

هو عبارة عن المتوسط الحسابي لمربعات الفروق بين قيم المتغير الإحصائي ومتوسطها الحسابي، ويستخدم مربعات الفروق هنا تفاديًا لاستخدام القيم المطلقة كما هو الشأن في الانحراف المتوسط.¹

يرمز للتباين بالرمز $V(x)$.

ويحسب حسب أنواع البيانات إن كانت مبوبة أو غير مبوبة وذلك كالتالي:

أ- حساب التباين في حالة البيانات الغيرمبوبة:

يحسب من خلال العلاقة التالية:

$$V(x) = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|^2}{n}$$

مثال: لتكن القيم التالية:

.90, 80, 70, 60, 50

المطلوب: إيجاد التباين؟

الحل:

نحدد أولاً المتوسط الحسابي:

$$= 70\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{50+60+70+80+90}{5}$$

حساب التباين:

$$V(x) = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|^2}{n} = \frac{|50-70|^2 + |60-70|^2 + |70-70|^2 + |80-70|^2 + |90-70|^2}{5} = \frac{1000}{5}$$

$$V(x) = 200$$

ب-حساب التباين في حالة البيانات المبوبة:

¹ مصطفى يوسف كافي و آخرون، الإحصاء في الادارة والاقتصاد، مكتبة المجتمع العربي، الأردن، الطبعة الأولى، 2012، ص 127.

في هذه الحالة يحسب التباين من خلال العلاقة التالية:

$$V(x) = \frac{\sum n_i |x_i - \bar{x}|^2}{n_i}$$

مثال: لتكن لدينا المعطيات التالية:

	3	2	1	x_i
	8	5	7	n_i

المطلوب: إيجاد التباين؟

الحل:

x_i	n_i	$n_i x_i$	$ X_i - \bar{X} $	$n_i X_i - \bar{X} $	$ X_i - \bar{X} ^2$	$n_i X_i - \bar{X} ^2$
1	7	7	1.85	12.95	3.42	23.94
2	5	10	0.85	4.25	0.493	2.465
3	8	40	2.15	17.2	4.622	36.98
	20	57		34.4		63.385

نحسب المتوسط الحسابي:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i n_i}{\sum n_i} = \frac{57}{20} = 2.85$$

$$V(x) = \frac{\sum n_i |x_i - \bar{x}|^2}{n_i} = \frac{63.385}{20} = 3.169$$

6-1 الانحراف المعياري:

من أهم مقاييس التشتت الانحراف المعياري ويرمز له بالرمز σ
ويعرف بأنه الجذر التربيعي للتباین ويحسب بالطريقة التي يتم حساب
التباین بها.

ويحسب الانحراف المعياري وفق حالتين:

أ- حالة البيانات الغير مبوبة: يحسب الانحراف المعياري بتجذير التباین.

$$\sigma = \sqrt{v(x)} = \sqrt{\frac{\sum(X_i - \bar{X})^2}{n}}$$

مثال: لتكن القيم التالية:

.90, .80, .70, .60, .50

المطلوب: احسب الانحراف المعياري؟

الحل:

إيجاد التباین: $v(x) = 200$

$$\begin{aligned}\sigma &= \sqrt{v(x)} \\ &= \sqrt{200} \\ &= 14.14\end{aligned}$$

ب- حالة البيانات المبوبة: يحسب الانحراف المعياري بتجذير التباین.

$$\begin{aligned}\sigma &= \sqrt{v(x)} \\ &= \sqrt{\frac{\sum(xi - x)^2 n_i}{\sum n_i}}\end{aligned}$$

مثال: أحسب الانحراف المعياري لمجموعة البيانات التالية:

الفئات	[5-10[[10-15[[15-20[[20-25[[25-30[المجموع
التكرار	8	12	15	10	5	50

الحل:

الفئات	n_i	x_i	$n_i x_i$	$(X_i - \bar{X})$	$(X_i - \bar{X})^2$	$n_i (X_i - \bar{X})^2$
[5-10[8	7.5	60	-9.5	84.64	677.12
[10-15[12	12.5	150	-4.5	17.64	211.68
[15-20[15	17.5	262.5	0.8	0.64	9.60
[20-25[10	22.5	225	5.8	33.64	236.40
[25-30[5	27.5	137.5	10.8	116.64	583.20
المجموع	50		835			1818

نحسب المتوسط الحسابي:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i n_i}{\sum n_i} = \frac{835}{50} = 16.7$$

ومنه الانحراف المعياري:

$$= \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 n_i}{\sum n_i}} = \sqrt{\frac{1818}{50}} \sigma = \sqrt{v(x)} \\ = 6.0299$$

ج- خواص الانحراف المعياري:

- 1- إذا كان الانحراف المعياري أقل من 15% من المتوسط الحسابي دل ذلك على قلة التشتت وان كان أكبر من 30% من المتوسط الحسابي دل ذلك على قوة التشتت لعناصر المجموعة وقلة تجانسها.
- 2- الانحراف المعياري هو مقياس قوة أي لا يتاثر بعدد المجموعة (أي طول المجموعة).

- 3- يأخذ الانحراف المعياري نفس وحدة القياس للمتغير الأصلي (كـغ، متر، لتر....) لذلك لا يمكن استخدامها كأساس للمقارنة بين تشتت توزيعين لهما وحدات قياس مختلفة.
- 4- بما أن الانحراف المعياري يتأثر بالمتوسط الحسابي لبيانات الظاهرة فإنه لا يمكن استخدامه للمقارنة بين تشتت بيانات توزيعين لهما متوسط حسابي مختلف ولو كان هذين التوزيعين من نفس النوعية.
- 5- لا يمكن إيجاده بالنسبة للتوزيعات التكرارية المفتوحة من البداية أو النهاية.
- 7- خواص المدى:**
- 1- يعتبر المدى مقاييسا بسيطا وسهلا للتشتت.
 - 2- يعتبر المدى مقاييسا لمراكز القيم لاعتماده على القيم عند مراكز معينة في التوزيع.
 - 3- يتأثر المدى بالقيمتين المتطرفتين في المجموعة فقط مع إهمال باقي القيم.
 - 4- لا يمكن حسابه في حالة التوزيعات التكرارية المفتوحة.
- يكثـر استخدامه في المراقبة الإحصائية على جودة الإنتاج.
- 2- معامل الاختلاف:**

رأينا سابقاً أن الانحراف المعياري هو مقياس واقعي ومؤشر صحيح عن مقدار التشتت غير أن الخاصيتين 4 و 5 السابقتين تبيـنـان أنه إذا استخدمنا هذا المقياس للمقارنة بين تشتت ظاهريـن أو أكثر فإن المقارنة تكون واقعـية وواقعـية فقط إذا كانت الظواهر من نوعـية واحدة ولـها متوسطـات متـساوـية. أي يمكن مقارنة تشتـت درجـات مـادـة ما بدرجـات مـادـة

¹ معين أمين السيد، مرجع سابق، ص 100.
Bernard PY , opit, p 133.²

أخرى أو مقارنة تشتت دخل مجموعة من العمال بدخل مجموعة أخرى، وتكون المقارنة أكثر واقعية إذا كانت المتوسطات متساوية أو قربة من بعضها.

أما إذا كانت الظواهر من صفات مختلفة أو كانت متوسطاتها متباعدة، ولهذا السبب وجدت مقاييس أخرى سميت مقاييس التشتت النسبي تعتمد على تمييز البيانات وتقدير التشتت كنسبة مئوية للمتوسط، أهم هذه المقاييس هو معامل الاختلاف.

$$Cv = \frac{\sigma}{\bar{X}} \times 100 = \frac{\text{الانحراف المعياري}}{\text{المتوسط الحسابي}} \times 100$$

مثال: إذا كان متوسط درجات مجموعة من الطلبة في مادة الإحصاء هو 16 بانحراف معياري 4 ومتوسط درجاتهم في مادة الرياضيات هو 10 بانحراف معياري 3، فـ أي الدرجات بنظرك أكثر تشتتاً؟

الحل:

$$Cv = \frac{4}{16} \times 100 = 25\%$$

$$Cv = \frac{3}{10} \times 100 = 30\%$$

ومنه درجات مادة الرياضيات الأكثر تشتتاً.

تمارين مقترحة للمحور الرابع:

التمرين الأول:

الجدول التالي يبين أعمار المرضى الذين يزورون إحدى العيادات الخاصة لـ 100 مريض.

المجموع]80-70]]70-60]]60-50]]50-40]]40-30]]30-20]]20-10]]10-0]	الأعمار
100	17	12	11	9	5	3	8	35	عدد المرضى

المطلوب: أحسب الانحراف المتوسط؟

التمرين الثاني:

إذا كانت علامات 30 طالب في امتحان الإحصاء للسنة أولى جدع مشترك كالتالي:

العلامة	18	16	14	12	10
النكرار	2	4	10	6	8

المطلوب:

1- أوجد متوسط علامات هؤلاء الطلبة؟

2- أحسب المدى لعلامات الطلبة؟

3- أحسب التباين؟

4- أحسب الانحراف المعياري؟

التمرين الثالث:

إذا عملت أن معامل الاختلاف لإنتاج أحد المصانع في فترة ما هو 10%， أوجد عدد أيام هذه الفترة

إذا كان الانحراف المعياري للإنتاج هو 8 ومجموع إنتاج الفترة يساوي 600 وحدة؟.

التمرين الرابع:

الجدول الآتي يبين أرباح شركتين متنافستين في سوق الأعمال ٢٠١٧ بملايين الدينارات.

الشركة X	10	65	30	20	8
الشركة Y	25	40	35	25	10

أي الشركتين أفضل في نظرك ولماذا؟

حل التمرين الأول:

العمر	n_i	x_i	$n_i x_i$	$ X_i - \bar{X} $	$n_i X_i - \bar{X} ^2$
[0-10[35	5	175	31.1	1088.5
[10-20[8	15	120	21.1	168.8
[20-30[3	25	75	11.1	33.3
[30-40[5	35	175	1.1	5.5
[40-50[9	45	405	8.9	80.1
[50-60[11	55	605	18.8	207.9
[60-70[12	65	780	28.9	346.8
[70-80[17	75	1275	38.9	661.3
المجموع	100		3610		2592.2

متوسط العمر

$$\bar{X} = \frac{\sum n_i X_i}{\sum n_i} = \frac{3610}{100} = 36.1$$

الانحراف المتوسط:

$$E_x = \frac{\sum n_i |X_i - \bar{X}|}{\sum n_i} = \frac{2592.2}{100} = 25.92$$

أي أن متوسط العمر الذي يزوره الأشخاص في العيادة هو 36.1 سنة بانحراف معياري 25.92 سنة.

حل التمرين الثاني:

x_i	العلامة	n_i	التكرار	$n_i x_i$	$ X_i - \bar{X} $	$n_i X_i - \bar{X} ^2$
10		12		120	3.1	37.5
12		8		96	1.1	8.8
14		6		140	0.9	9
16		10		96	2.9	5.8
18		4		72	4.9	19.6
المجموع		40		524		80.4

-1- متوسط علامات الطلبة هي:

$$\bar{X} = \frac{\sum n_i X_i}{\sum n_i} = \frac{524}{40} = 13.1$$

-2- حساب المدى:

$$R = X_{\max} - X_{\min} = 18 - 10 = 8$$

-3- التباين:

$$V(x) = \frac{\sum n_i |X_i - \bar{X}|}{\sum n_i} = \frac{80.4}{40} = 13.1$$

-4- الانحراف المعياري:

$$\delta = \sqrt{13.1} = 3.61 \delta(x) = \sqrt{V(x)}$$

حل التمرين الثالث:

عدد أيام الفترة:

$$cv = \frac{\delta(x)}{\bar{X}} = \frac{8}{600} = 0.10$$

$$n = 5$$

ومنه عدد أيام الفترة هو 5 أيام .

حل التمرين الرابع:

X_i	X_i^2	Y_i	Y_i^2
8	64	10	100
20	400	25	625
30	900	35	1225
67	4489	40	1600
10	100	25	625
135	5953	135	4175

متوسط أرباح الشركة x :

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{\sum n_i} = \frac{135}{5} = 27$$

متوسط أرباح الشركة y :

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{\sum n_i} = \frac{135}{5} = 27$$

$$S_x = \sqrt{\frac{\sum X_i^2}{n_i} - \bar{X}^2} = \sqrt{\frac{5953}{5} - 27^2} = 34.11$$

$$S_y = \sqrt{\frac{\sum y_i^2}{n_i} - y^2} = \sqrt{\frac{4175}{5} - 27^2} = 28.42$$

على الرغم من أن متوسط أرباح الشركتين متساوي خلال الفترة إلا أن أرباح الشركة (y) أقل تشتتاً (أكثر استقراراً) من أرباح الشركة (x) وهذا ما يجعل الشركة (y) أفضل بالنسبة للمستثمرين.